

化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類表（男性）

男性 (治療関連による無精子症になるリスク)		低リスク	中リスク	高リスク
化学療法	Cyclophosphamide equivalent dose (CED)	☐ <4,000 mg/m ² <4,000 mg/m ² : 約90%は精液所見正常	— —	☐ ≥4,000 mg/m ² ≥4,000 mg/m ² : 精子運動性低下 ≥8,000 mg/m ² : 無精子症が遷延・永続
	アルキル化薬	CEDの項で該当箇所にチェックすること。		
	白金製剤		☐ CDDP <600 mg/m ² ☐ CBDCA ☐ L-OHP	☐ CDDP >600 mg/m ²
	アントラサイクリン		☐ DXR ☐ IDR ☐ DNR ☐ MIT	
	代謝拮抗薬	☐ 6-MP ☐ MTX ☐ Flu	☐ Ara-C ☐ GEM	
	ビンカアルカロイド	☐ VCR ☐ VBL		
	その他	☐ ETP ☐ BLM ☐ Act-D ☐ MMC		
	レジメン別	☐ ABVD ☐ CHOP ☐ COP	☐ BEP 2～4サイクル	☐ BEACOPP : >6サイクル ☐ 骨肉腫治療 ☐ ユーイング肉腫治療
	化学療法＋放射線治療			☐ アルキル化薬＋骨盤照射 ☐ アルキル化薬＋精巣照射
				☐ TMZ＋頭蓋照射 ☐ BCNU＋頭蓋照射
放射線治療	造血幹細胞移植			☐ BU+CPA ☐ Flu+L-PAM
				☐ アルキル化薬＋全身照射
		☐ 放射性ヨウ素（I-131）		
	全身照射			☐ 実施あり
	頭蓋照射			☐ ≥40 Gy
	骨盤照射			☐ 実施あり
	精巣照射	☐ <0.7 Gy	☐ 1～6 Gy	☐ 成人男性 >2.5 Gy ☐ 小児 ≥6 Gy

（日本癌治療学会編 小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2024年12月改訂 第2版より一部改変）

化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類表（女性）

女性 〔治療による早発卵巣不全（POI）リスク〕		POIリスク 「低」	POIリスク 「中」	POIリスク 「高」
化学療法	Cyclophosphamide equivalent dose (CED)	☐ <4,000 mg/m ² 思春期前（月経未発来）の場合には以下の範囲となる。初経後しばらくは明確な線引きが困難。 ☐ <8,000 mg/m ²	☐ 4,000～8,000 mg/m ² ☐ 8,000～12,000 mg/m ²	☐ >8,000 mg/m ² ☐ >12,000 mg/m ²
	薬剤別	CEDの項で該当箇所にチェックすること。		
	アルキル化薬			
	白金製剤		☐ CDDP<600 mg/m ² ☐ CBDCA	☐ CDDP>600 mg/m ²
	代謝拮抗薬	☐ Ara-C ☐ MTX ☐ GEM ☐ 6-MP		
	ビンカアルカロイド	☐ VCR		
	モノクローナル抗体	☐ Bmab		
	レジメン別	AC/EC±タキサン	☐ AC×4サイクル（40歳未満）	☐ AC×4サイクル（40歳以上）
			☐ AC/EC×4サイクル' +タキサン（35歳未満）	☐ AC/EC×4サイクル' +タキサン（35歳以上）
			☐ (F)EC×4サイクル + dose dense タキサン	
		CMF, CEF, CAF, TAC	☐ CMF ☐ CEF ☐ CAF ☐ TAC 6サイクル（30歳未満）	☐ CMF ☐ CEF ☐ CAF ☐ TAC 6サイクル（40歳以上）
		FOLFOX	FOLFOX（40歳未満）	FOLFOX（40歳以上）
		Escalated BEACOPP	☐ Escalated BEACOPP 2サイクル	☐ Escalated BEACOPP 6-8サイクル（30歳未満）
		CHOP	☐ CHOP 6サイクル（35歳未満）	☐ CHOP 6サイクル（35歳以上）
		Dose-adjusted EPOCH	☐ Dose-adjusted EPOCH 6サイクル（35歳未満）	☐ Dose-adjusted EPOCH 6サイクル（35歳以上）
		その他	☐ ABVD ☐ CVP	
			☐ BEP ☐ EP（30歳未満）	
	疾患別治療	☐ 急性骨髄性白血病治療 ☐ 急性リンパ性白血病治療		☐ 骨肉腫治療 ☐ ユーイング肉腫治療
化学療法＋放射線治療				☐ TMZ＋頭蓋照射 ☐ BCNU＋頭蓋照射 ☐ アルキル化薬＋骨盤照射
造血幹細胞移植				☐ CPA, BU, L-PAMを含むレジメン ☐ 全身照射を含むレジメン
放射線治療		☐ 放射性ヨウ素（I-131）		
				☐ 頭蓋照射 >40 Gy
			☐ 腹部／骨盤（思春期前） 10-＜15 Gy	☐ 腹部／骨盤（思春期前） ≥15 Gy
			☐ 腹部／骨盤（思春期以降） 5-＜10 Gy	☐ 腹部／骨盤（思春期以降） ≥10 Gy ☐ 腹部／骨盤（成人女性） >6 Gy